



Avertissements[®]

agricoles

Auvergne

ISSN : 0763 - 7756

Grandes cultures

N° 13
Supplément n° 2

Le 29 Octobre 1991

COLZA

Charançon du bourgeon terminal :
Intervenir d'urgence dans 63 et 43.

CEREALES

Cicadelles et Pucerons : Activité faible.

COLZA

Stades 2 feuilles (B2) à 7-8 feuilles (B7 - B8).

CHARANÇON DU BOURGEON TERMINAL

✪ Situation

- En HAUTE-LOIRE (secteur de BRIOUDE) et dans le PUY-DE-DOME, le vol a débuté entre le 10 et le 14/10. Un "pic" de vol a été noté entre le 15/10 et le 20/10.
- Dans l'ALLIER : aucune capture à ce jour, sauf à MONTOLDRE.

Piégeages charançons du bourgeon terminal (cumuls)

43	63	03
ST GERON = 0 FLAGEAC = 2 LYCEE AGRICOLE FONTANNE = 2	CHAZELLES = 1 BORT-LETANG = 0 LES PRADEAUX = 21 MEZEL = 2 GIGNAT = 0	LORIGES = 0 TRETEAU = 0 SAULZET = 0 TREIGNAT = 0 CHARMES = 0 ST-POURCAIN/BESBRE = 0 MONTOLDRE = 1

✪ Préconisation

Le Colza est réceptif aux pontes de ce charançon à partir du stade 3 feuilles (B3).

Intervenir rapidement, dès réception et avant le 10/11 avec un pyrèthrinoïde homologué dans tous les secteurs où des captures sont notées dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire sur les colzas ayant plus de 3 feuilles.

Dans l'ALLIER, surveiller attentivement vos cuvettes dans les secteurs où ce ravageur se manifeste habituellement et intervenir 10 jours après les premières captures.

Pour les parcelles qui ont moins de 3 feuilles, le traitement sur les adultes est peu justifié; un traitement de rattrapage sur les jeunes larves pourra être nécessaire en hiver en fonction du risque (suivre nos indications).

Pour le choix de l'insecticide, consulter la fiche "Les Ravageurs du Colza" parue dans le bulletin n° 12 du 18/09/91.

CEREALES

(Peu de céréales levées.
Stades)
(Les semis sont en cours.

CICADELLES ET PIEDS CHETIFS

★ Situation

L'activité est très ralentie depuis le 20/1, suite à la période de gelées.

POSTES	7/10 au 13/10	14/10 au 20/10	21/10 au 27/10
SAULCET	2	7	0
SAULZET	3	0	0
LES PRADEAUX	7	0	0
TOTAL	12	7	0

★ Préconisation

Aucune intervention ne se justifie actuellement. Maintenir une surveillance dès la levée de vos céréales, notamment dès qu'une période ensoleillée et douce survient.

PUCERONS ET J.N.O

★ Situation

- En cultures : sur les quelques céréales levées, les infestations sont faibles (5 % environ de pieds colonisés).

Depuis 8 jours, on assiste à une stagnation des infestations.

- Tour à succion d'ORLEANS : le vol est en nette régression.
- Pouvoir virulifère : en diminution.

★ Préconisation

Surveiller les parcelles dès leur levée. Intervenir en cas de redoux si les populations augmentant (seuil 10 à 15 % de plantes porteuses d'au moins un puceron).

Traiter en présence de pucerons, mais aussi de soleil qui permet une activité des insectes et facilite leur destruction.

TRAITEMENTS DES SEMENCES

Soyez très attentif à la protection de vos semences. Pensez à : Carie, Charbons, Helminthosporiose gramineum, Mouche grise, etc... Pour le carie qui est en recrudescence en AUVERGNE, employez de préférence une triazole comme flutriafol (QUINOLEATE PLUS HIFI - VINCIT ...) ou triadiménol (BAYTAN).